



MALADIE FOLIAIRE CERCOSPORIOSE NOS RECOMMANDATIONS

Juin 2026

À l'approche de l'été, la surveillance sanitaire s'intensifie dans les parcelles de betteraves. Si la cercosporiose reste discrète pour l'instant, la précocité des cultures invite à la vigilance. En parallèle, les premiers foyers de jaunisse apparaissent dans plusieurs secteurs.

Cercosporiose, important réservoir de spores

Pour réussir à contrôler la cercosporiose, il est primordial de ne pas la laisser s'installer sur vos parcelles. Les seuils d'intervention IPM (Indice de Pression Maladie) sont définis ci-dessous :

Seuils d'intervention de la cercosporiose

T1	T2	T3
1 %	20 %	25 %

 Vous pouvez consulter la carte de l'outil **Alerte Maladies** de l'ITB et de l'ensemble de la filière pour caractériser au mieux votre situation.



Les recommandations pour lutter contre la cercosporiose

Alerte SMS



Déclenchement du traitement dans les 24 à 48 heures suivant l'alerte.

Alternance des matières actives



Respecter l'alternance des familles chimiques pour éviter les résistances.

Pas de demi-dose



Demi-dose = réduction d'efficacité et de persistance dans le temps.

Associer le cuivre à l'action fongicide des triazoles



Pour une efficacité optimum.

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DISPONIBLES :

CUIVRE AIRONE SC**

272 g/l cuivre oxychlorure et cuivre hydroxyde
3 applications par an - dose homologuée 3,5 l/ha
**Dérogation de 120 j pour renforcer l'efficacité des programmes et les performances des fongicides associés.
Ne pas dépasser 4 kg/ha de cuivre par an.

BELANTY

75 g/l méfentrifluconazole
DAR 28 jours - 2 applications par an - dose homologuée 1,5 l/ha

PASSERELLE

250 g/l difénoconazole
DAR 21 jours - 2 applications par an - dose homologuée 0,5 l/ha

PROPULSE / YEARLING

125 g/l prothioconazole + 125 g/l fluopyram
DAR 7 jours - 2 applications par an - dose homologuée 1,2 l/ha

REVYSTAR XL

50 g/l fluxapyroxad + 100 g/l méfentrifluconazole
DAR 28 jours - 2 applications par an - dose homologuée 1 l/ha

SPYRALE*

375 g/l fenpropidine + 100 g/l difénoconazole - DAR 28 jours
2 applications par an - dose homologuée 1 l/ha
*1 application par an sur sols artificiellement drainés - dose homologuée 0,9 l/ha

TIMBAL EW

125 g/l tétraconazole
DAR 14 jours - 1 application par an - dose homologuée 0,8 l/ha

UNIVQ

50 g/l fenpropidine + 100 g/l prothioconazole
DAR 35 jours - 2 applications par an - dose homologuée 1,5 l/ha

DAR : Délai avant récolte

En fin de campagne, la destruction des cordons de déterrage évite de constituer un réservoir de la maladie.

Exemple de programme T1, T2 et T3

T1	T2	T3
Propulse / Yearling (fluopyram + prothioconazole) à 1,2 l/ha + 1,8 l/ha AIRONE SC** si forte pression	SPYRALE* 1 l/ha + 1,8 l/ha AIRONE SC**	Timbal EW 0,8 l/ha + Passerelle 0,5 l/ha + AIRONE SC** 1,8 l/ha Selon la date d'arrachage précisée après le 18 août par votre service betteravier.