



MESURES PROPHYLACTIQUES CONTRE LA JAUNISSE VIRALE

MARS 2026

Agir sur les réservoirs viraux dès aujourd'hui

L'année 2025 a été marquée par une très forte pression virale dans les bassins betteraviers picards et normands, heureusement bien maîtrisée par la bonne protection aphicide faite sur vos cultures. Les analyses conduites au mois de janvier 2026 par l'Institut technique de la betterave (ITB) révèlent une situation critique : 70 % des repousses de betteraves (sur cordons de déterrage ou en parcelles de céréales) sont porteuses de virus, notamment d'un polérovirus et/ou du BYV, le plus virulent. À titre de comparaison, ce taux était inférieur à 15 % les années précédentes.

Avec des conditions météorologiques actuelles particulièrement douces, la prolifération des pucerons vecteurs est imminente. Il est donc impératif d'agir sur les réservoirs viraux avant que les pucerons ne s'y chargent et ne contaminent les semis de 2026.



Pourquoi agir maintenant ?

L'objectif est de rompre le cycle de transmission du virus. **Les repousses de l'année dernière constituent des «réservoirs»** où les pucerons du printemps puisent le virus avant d'infester les nouvelles cultures. La destruction de ces repousses est une étape de responsabilité collective pour tous les planteurs de la filière.

Gestion des cordons de déterrage, comment procéder ?

Les cordons de déterrage ont été identifiés par le Plan National de Recherche et d'Innovation (PNRI) comme l'un des principaux vecteurs de persistance du virus. Deux leviers sont à votre disposition :

1. La gestion mécanique

- **Destruction par broyage** : Si le sol le permet, un broyage fin des repousses sur les zones de stockage limite la survie des plantules.
- **Retournement** : Enfouir les résidus lors des travaux de sol pour empêcher les pucerons d'accéder aux feuilles vertes.
- **Nettoyage des sites** : Veiller à ce qu'aucune plantule ne survive sur les pourtours des anciens emplacements de silos.

2. La gestion chimique

Désherbage ciblé : Utiliser des solutions herbicides homologuées pour détruire les repousses dès leur levée. Rapidité d'intervention : L'efficacité est maximale sur des plantules jeunes, avant que les colonies de pucerons ne s'y installent durablement.


L'application de glyphosate sur les cordons de déterrage. Plusieurs usages possibles selon la localisation des repousses et les spécialités commerciales.

- Pour un silo ayant été constitué dans le champ : « *Traitement généraux désherbage / Interculture, jachère et destruction de cultures* ». Uniquement dans le cas de non labour avant la culture 2026.

- Pour un silo ayant été constitué en bordure de parcelle : « *Traitements généraux désherbage / Zones agricoles non cultivées* »



**MESURES PROPHYLACTIQUES
CONTRE LA JAUNISSE VIRALE**



Gestion des repousses dans les céréales implantées après betteraves, comment faire ?



Contrôlez la présence de repousses de betteraves après le passage des herbicides d'automne.



Si des repousses sont observées, l'application d'un traitement antidicotylédones est préconisé pour stopper le développement des foyers.

Remarque : Utiliser un produit d'une autre famille que les sulfonylurées pour les repousses de betteraves Conviso® Smart.



BON À SAVOIR

La gestion rigoureuse des repousses de betteraves constitue également le levier le plus efficace pour réduire la pression de la cercosporiose en éliminant les foyers d'infection capables de diffuser des spores dès le mois de mai si les conditions sont favorables.

