



ALERTE JAUNISSE

Avril 2020

Suite aux conditions climatiques de ces derniers jours, on observe une augmentation importante des populations de pucerons verts sur betteraves à partir du stade 2 feuilles vraies. Au stade cotylédon, nous n'observons pas de pucerons pour le moment.



Betterave au stade cotylédon



Betterave au stade 2 feuilles



Pucerons verts aptères sur la face inférieure d'une feuille de betterave

Quand intervenir sur les pucerons ?

La sensibilité de la betterave au virus de la jaunisse démarre au stade 2 feuilles vraies des betteraves et dure jusqu'au stade 12 feuilles. Durant cette période, il convient d'être extrêmement vigilant.

À partir du stade 2 feuilles vraies, il faut observer la face inférieure des feuilles pour s'assurer de la présence ou non de pucerons verts aptères (sans ailes).

SEUIL D'INTERVENTION : Présence de pucerons verts aptères sur au moins 3 betteraves sur 25 observées.

Quel produit utiliser sur pucerons verts ?

Pour lutter contre les pucerons verts, deux produits sont efficaces et disponibles actuellement : Teppeki et Movento.

	MOVENTO	TEPEKI
Stade d'intervention	À partir du stade 2 feuilles	À partir du stade 6 feuilles
Nombres d'application	2 (avec un délai minimal de 14 jours)	1
Composition	Spirotetramat 100 g/l	Fonicamide 500 g/kg
Dose homologuée	0.45 l/ha	140 g/ha
Volume d'eau	120 – 130 l/ha	200 l/ha mini
Adjuvant	Non	Oui
Mélangeable en bouillie herbicide	Non	Possible

AVANT TOUTE UTILISATION D'UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE, LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE SUR L'EMBALLAGE ET SUIVRE LES RECOMMANDATIONS D'UTILISATION.