



DÉSHERBAGE LES GRAMINÉES ARRIVENT

Avril 2019

Les conditions climatiques du mois d'avril ont été favorables au développement des graminées. Il faut donc être vigilant et intervenir au bon moment avec un graminicide de post levée à base cléthodime.



Conditions de traitement :

Comme tout produit systémique, la molécule de cléthodime migre au sein de la plante pour s'accumuler dans les organes de croissance. Pour cette raison, le traitement doit être réalisé lorsque les conditions sont poussantes :

- Température > 15°C
- Faible amplitude de température (+/- 5°C)
- Hygrométrie > à 70%

Stades optimum d'intervention :

Le positionnement du traitement est déterminant :

Stade minimum : ne pas intervenir avant le stade 3 feuilles pour avoir suffisamment de surface foliaire et attendre les dernières levées d'adventices.


Stade maximum : intervenir jusqu'au stade début tallage. Passé ce stade l'efficacité des produits est moindre.

Laisser un délai minimum de 2 à 3 jours entre l'intervention anti-graminées et le désherbage des dicotylédones.

Nos préconisations :

Comme le montre les résultats d'essai, la double adjonction apporte un supplément d'efficacité significatif, notamment lorsque la pression en Ray-grass et Vulpins est très importante.

Essai Ray-grass 2018
Louvrechy (80)



Pression RG / Vulpin	Programme
Faible	FolyR 1L + Actirob B 1L
Moyenne à forte	FolyR 1 + Actirob B 1 + Actimum 1L

AVANT TOUTE UTILISATION D'UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE, LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE SUR L'EMBALLAGE ET SUIVRE LES RECOMMANDATIONS D'UTILISATION.