



LA BETTERAVE

On y croit! TAM TAM AGRO!

Démarrage du désherbage - Mars 2017

Les semis avancent et déjà les désherbages de pré-levée sont déclenchés. La qualité de pulvérisation est primordiale pour obtenir une bonne efficacité des produits.

1. Préparer son pulvérisateur.

Chaque année, plusieurs dizaines d'hectares de betteraves sont détruits à cause d'un mauvais rinçage de pulvérisateur.

Nettoyage du pulvérisateur : ne pas faire l'impasse

- Utiliser un nettoyant efficace contre les sulfonylurées ou tout autre produit phytosanitaire lorsque vous passez d'une culture à l'autre.
- Vérifier l'état de propreté des filtres d'aspiration et de refoulement.
- Vérifier l'état des buses et leur bon positionnement.
- Contrôler le débit des buses pour s'assurer de l'homogénéité de la pulvérisation.

Remplissage du pulvérisateur : respecter l'ordre

Commencer à incorporer les produits lorsque la cuve est remplie au 3/4 et le faire progressivement :

1. Correcteurs de pH
2. Produits solides (formulations granulées puis les poudres)
3. Produits liquides
4. Adjuvants



2. Optimiser la pulvérisation.



Pour obtenir un nombre suffisant de gouttelettes au cm² et garantir une bonne efficacité du désherbage, un volume d'eau de 120-150 L/ha est recommandé.

Lors de l'intervention : respecter les fondamentaux

- Hygrométrie > 70 %.
- Vent faible pour éviter les dérives (<19 km/h).
- Traiter de préférence le matin.
- En cas de gel matinal, attendre que les températures redeviennent positives.




LA BETTERAVE

On y croit! TAM TAM AGRO!

Démarrage du désherbage - Mars 2017

3. Démarrage du désherbage : la pré-levée.

Le désherbage en pré-levée est utile dans certaines situations pour contrôler une ou des flore(s) bien spécifique(s) telles que les graminées (vulpin et ray-grass), les ombellifères (éthuse et ammi majus), les matricaires et les renouées des oiseaux.



Dans tous les cas, la pré-levée doit se faire au plus près des semis pour profiter de l'humidité de la terre.

À cause des risques de brûlure, dès lors que le germe commence à sortir de la graine, il faut arrêter les traitements de pré-levée.

Nom commercial	Matières actives	Application	Adventice cible
MERCANTOR GOLD (0,6 L)	S-Metolachor	Sur Semis	Ray-grass, Vulpin
ZEPPLIN (3 L)	Quinmérac Chloridazone	Sur Semis	Ethuse, Ammi majus
GOLTIX 90 (1,5 kg)	Métamitron	Avant ou sur le Semis	Matricaire, Renouée des oiseaux
ZEPPLIN (2 L) + GOLTIX 90 (0,8 kg)	Quinmérac Chloridazone Métamitron	Sur Semis	Flore complexe

Avant toute utilisation d'un produit phytosanitaire, lire attentivement l'étiquette sur l'emballage et suivre les recommandations d'utilisation.